VÉDŐOLTÁS 6. osztályosoknak

A vírusok okozta, cseppfertőzéssel terjedő fertőző gyermekbetegségek közül - a **kanyaró, a mumpsz, a rózsahimlő** –a megbetegedések megelőzése céljából Magyarországon az általános iskola minden 6. osztályos tanulója **MMR védőoltásra** kötelezett, melynek beadása szeptember hónapban történik.

A **kanyaró** (morbilli, M)

9-10 napos lappangási idő után lázzal, köhögéssel, huruttal és kötőhártya-gyulladással kezdődik, majd pár nap múlva a fül mögött kezdődő és az egész testen végigvonuló kiütések lépnek fel. Súlyos betegség, mely könnyen átvihető egyik emberről a másikra.

A járványos fültőmirigy gyulladás (mumpsz, M)

2-3 hét lappangási idő után lázzal és az egyik, majd a másik oldali nyálmirigy duzzanatával jár. Fiúknál a betegség szövődményeként jelentkező heregyulladás súlyos következményekkel járhat.

A rózsahimlő (rubeola, R)

lappangási ideje 2-3 hét. Gyermekeknél enyhe formában zajlik, láz apró kiütések, tarkótáji nyirokcsomó duzzanat formájában. A terhesség első harmadában átvészelt fertőzés következménye lehet az ún. **veleszületett rubeola** (fejlődési rendellenességekben jelentkezik).

Az oltás beadása a felkarba történik szülői beleegyező nyilatkozat megléte esetén.

Oltási reakció: az oltóanyag, élő gyengített kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusokat tartalmaz. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a védekező-rendszerre. Általában az 5-12. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél észleltek és 1-2 napnál nem tartanak tovább.

Teendő: a lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel.

Az oltás igazolása a gyermekegészségügyi kiskönyvbe (oltási könyv) történik.

Di-Per-Te: az általános iskolák 6. osztályos tanulói **október** hónapban kapják meg az iskolában.

A (Difteria) **torokgyík**

baktérium okozta fertőzőbetegség. A kórokozó főleg a légutakat, néha a bőrt támadja meg. A torokban, rendszerint a mandulákon, ritkán a gégében, vagy más nyálkahártyákon, esetleg a bőrön tapad meg és vaskos szürkés lepedéket hoz létre. Súlyos légzési nehézséget és esetenként fulladást okoz. A baktérium toxint (mérget) is termel, ami idegrendszeri károsodást, szívbetegséget, sőt még halált is okozhat.

A (Pertussis) szamárköhögés

Baktérium hatására a légutak nyálkával telítődnek. Jellemzője a görcsös köhögési roham, nehéz belégzés.

A (Tetanus) merevgörcs

igen súlyos, magas halálozással járó betegség. A kórokozó földdel szennyezett seben keresztül jut be a szervezetbe és ott toxint (mérget) termel. A toxin súlyos idegméreg, amelynek hatására az izmok görcsös állapotba kerülnek.

Az oltás beadása a felkarba történik **szülői beleegyező nyilatkozat** megléte esetén.

Oltási reakcióként a szúrás helyén fájdalom, bőrpír jelentkezhet, kísérheti pár napos hőemelkedés, láz.

Teendő: hidegvizes borogatás a szúrás helyénél, folyamatos megfigyelés, szükség esetén lázcsillapítás.

Az oltás igazolása a gyermekegészségügyi kiskönyvbe (oltási könyv) történik.

Kérdéseddel keresd fel az iskola orvosát, védőnőjét!